

2023–2024 recomendaciones de vacunas contra la COVID-19

¿Cuáles son las nuevas recomendaciones de la vacuna contra la COVID-19 para 2023-2024? ¿Quién es apto para recibir la vacuna actualizada?

Los CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades) y el ACIP (Advisory Committee on Immunization Practices, Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización) han recomendado que todos los mayores de cinco años reciban una dosis actualizada de una vacuna de ARNm. La dosis actualizada debe administrarse al menos dos meses después de cualquier dosis previa de la vacuna contra la COVID-19.

Las personas de seis meses o más que estén inmunodeprimidas de forma moderada o grave pueden requerir dosis adicionales.

¿Sigue siendo necesaria la serie primaria de dos dosis para las personas sin vacunación previa contra la COVID-19?

Para cualquier persona de 12 años o más que no esté vacunada, se recomienda una dosis de la vacuna actualizada 2023-2024 contra la COVID-19.

¿Cuál es la recomendación para las personas que recibieron la serie primaria de vacunas contra la COVID-19 y/o de refuerzo?

Las personas que recibieron previamente cualquier número de dosis de la vacuna contra la COVID-19 deben recibir una dosis de la vacuna contra la COVID-19 de 2023-2024 al menos ocho semanas después de la última dosis, a menos que ya hayan recibido la vacuna contra la COVID-19 de 2023-2024.

¿Qué vacunas contra la COVID-19 se han aprobado y/o autorizado para su uso en EE. UU.?

Las dos vacunas de ARNm aprobadas en EE. UU. son las vacunas actualizadas 2023-2024 contra la COVID-19 de Pfizer (Comirnaty) y Moderna (Spikevax).

¿Puedo recibir una vacuna bivalente?

No. La FDA retiró la autorización de la EUA para las vacunas bivalentes contra la COVID-19 y ya no están autorizadas para su uso.

¿Puedo “mezclar y combinar” productos de vacunas?

Sí, las personas vacunadas previamente pueden recibir una vacuna actualizada contra la COVID-19 de Pfizer (Comirnaty) o Moderna (Spikevax). En estos casos, se permite “mezclar y combinar”.

¿Puedo recibir la vacuna contra la COVID-19 si actualmente estoy enfermo con COVID-19?

La vacunación contra la COVID-19 debe aplazarse para cualquier persona con infección actual por SARS-CoV-2 hasta que se recupere de su enfermedad aguda y se hayan cumplido los criterios para interrumpir el aislamiento. Las personas asintomáticas deben recibir una vacuna contra la COVID-19 después del periodo de aislamiento recomendado. Las personas que hayan tenido recientemente una infección por SARS-CoV-2 pueden considerar retrasar la vacuna contra la COVID-19 tres meses después del inicio de los síntomas o una prueba positiva.

¿Existen diferentes efectos secundarios o preocupaciones de seguridad con las vacunas de ARNm actualizadas para 2023-2024?

No, los efectos secundarios y los perfiles de seguridad son los mismos que los de las formulaciones anteriores. Los efectos secundarios han sido similares a los de las vacunas habituales: dolor de brazo, fatiga, fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, mialgia y artralgia. Estos efectos secundarios son temporales y en su mayoría leves o moderados. Se ha observado anafilaxia después de recibir vacunas de ARNm contra la COVID-19, pero esto ha sido poco frecuente.

¿Cómo se supervisa la seguridad de las vacunas?

LOS datos de seguridad se recopilan a través del sistema de notificación de acontecimientos adversos de la vacuna (VAERS), el enlace de datos de seguridad de la vacuna (VSD), la evaluación de seguridad de la inmunización clínica (CISA) y la farmacovigilancia¹.

¿Se puede administrar la vacuna contra la COVID-19 al mismo tiempo con otras vacunas?

Sí, los CDC y ACIP recomiendan esto para las personas que necesitan otras vacunas.



SI TIENE ALGUNA PREGUNTA, COMUNÍQUESE CON SU EQUIPO DE CUIDADO.

Su seguridad es nuestra máxima prioridad y estamos aquí para ayudarle en cada paso.

1. [cdc.gov/vaccinesafety/ensuringsafety/monitoring/index.html](https://www.cdc.gov/vaccinesafety/ensuringsafety/monitoring/index.html)